

Til enhver tid er det barnets tidligere sykdomsforhold, nåværende allmenntilstand og den aktuelle sykdom, som må legges til grunn for eventuelt fravær fra barnehagen. Barnets allmenntilstand MÅ være slik at det kan holde ut tiden det skal tilbringe i barnehagen før de sendes til barnehagen etter sykdom. Det vil si: FØLGE BARNEHAGENS DAGSRYTME.

Hva	Hvordan
Febersykdom/Infeksjoner	Holdes hjemme til det er feberfri.
Barnesykdommer.	De vanlige barnesykdommene som kusma, røde hunder og meslinger, er barna vaksinert for og vil bare unntaksvis være aktuelle fraværsgrunner.
Vannkopper	Kan møte i barnehagen når det er blitt tørre skorper på det siste utslettet. Dette tar vanligvis en uke fra de første utslettene bryter ut.
Brennkopper	Barnet må bli sett på av lege og behandling må starte ved påvist brannkopper. Sårene må være dekket til på barn som kommer i barnehagen. På små barn som ev. river av bandasjen/ plaster MÅ barnet holdes hjemme til en ser at der er skorpe på såret. Brannkopper ER svært smittsomme og derfor er det viktig å holde seg til gode rutiner / retningslinjer.
Den 5. barnesykdommen	<u>Barnet må ta blodprøve</u> , da denne sykdommen kan være farlig for gravide foreldre / personal i barnehagen. <u>Barnehagen MÅ få beskjed om resultatet av blodprøven</u> . Barnet holdes hjemme til blodprøven er tatt og analysert. Ved påvist 5.barnesykdom må barnet holdes hjemme til det er blitt tørre skorper på sårene og allmenntilstanden er god.
Barneinfeksjoner med antibiotikabehandling.	Barnet kan regnes for smittfri 2 dager etter at antibiotikabehandlingen er startet opp, forutsatt at barnet er feberfri. Hvis allmenntilstanden tillater det, kan de fra da av være i barnehagen.

Alvorlige infeksjoner med smitterisiko.	Dersom barnet får diagnostisert en smittefarlig alvorlig sykdom, slik som hjernehinnebetennelse, skarlagensfeber, alvorlige tarminfeksjoner eller lignende, er det viktig at foreldrene <u>straks</u> gir beskjed til barnehagen, slik at de nødvendige tiltak kan gjøres i barnehagen.
Oppkast /diaré	Har barnet kastet opp flere ganger eller har sterk diaré skal barnet holdes hjemme i 2 døgn. Oppkast og diaré ER SVÆRT SMITTSOMT og derfor må vi ta dette på alvor. Barnet sin allmenntilstand etter oppkast /diaré må tas på alvor. Barnet skal klare dagen i barnehagen. Barn som har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diaretilstand.
Øyekatarr	Med dagens kunnskap er det ikke av smittehensyn grunnlag for å anbefale at barn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Også her gjelder barnets allmenntilstand.
Hodelus	Hvis det oppdages i barnehagen er det ikke nødvendig å sende hjem. Men barnet må så raskt som mulig når det kommer hjem starte på lusekur og greie med lusekam.
Skabb	Barnet kan vende tilbake i barnehagen når behandling er igangsatt
Molusker, hånd – fot og munnsyke, munnsår, loppebitt, veggdyrbitt, vorter, RS-virus	Barnet trenger ikke å holdes hjemme

VED EN EV. PANDEMI KOMMER DET EGNE RETNINGSLINJER FOR HÅNTERING AV DETTE. 48 TIMERS REGELEN KAN DA TRE I KRAFT